

Vliv infuzní léčby Prostavasinem na kvalitu života (HRQoL) u pacientů s Ischemickou chorobou dolních končetin.

Mgr. Hana Kalová, (1, 2, 3, 4)

Doc. MUDr Petr Petr, PhD (1,2,3), Mgr. Šárka Králová (1,3),

Ing. Alexandra Soukupová (4)

1) Oddělení vědy a výzkumu, VŠERS, České Budějovice

2) Nemocnice České Budějovice, Pracoviště klinické farmakologie

3) Katedra veřejného zdravotnictví, ZSF JU Č. Budějovice, Pracoviště klinické farmakologie


4) European Medical Agency- EMA, nadační fond, České Budějovice

Autoři prokazují příznivý vliv infusní kúry přípravkem Prostavasín inj. sicca výrobce Schwarz Pharma AG jak na kvalitu života, tak na délku klaudikačního intervalu probandů-nositelů ischemické choroby dolních končetin ve stadiu Ib-III.

	Před	Po	%	u
Physical function	40,41	47,30	118	1,42
Role limitation - physical	25,00	31,76	127	0,97
Role limitation - emotional	52,25	62,16	119	1,18
Social functioning	62,16	60,14	98	0,37
Pain	38,14	47,45	125	2,18
Mental health	64,65	67,89	105	0,95
Vitality	44,59	48,38	109	1,06
General health perception	38,78	40,27	107	0,38

n = 37 (M = 20, Ž = 17)

pakli u je větší nežli 1,67, platí že rozdíl je statisticky významný na 5 % hladině významnosti



Vliv infuzní léčby prostavasinem na délku klaudikačního intervalu u pacientů s ICHDK

Léčba: 20x 20 μ g/PGE1, Prostavasin Schwarz Pharma AG,
inj. sicca i.v./250ml FR

	SIGNAL	LIMIT
Před (n = 37)	132	233
Po (n = 37)	290	509
d%	220	219

Klaudikační interval v metrech, zaokrouhлено na celé metry.

Signal = klaudikační interval do signální bolesti

Limit = klaudikační interval do limitující bolesti

